Literatur.

Proceedings of the Malacological Society of London Vol. 5 No. 6.

p. 344. Stone, J. H. von, on the embryonic shell of Planorbis. With fig. 5.

„ 344. Reynell, A., on the occurrence of Planorbis marginatus and Limnaea pereger in the Post-Pliocene of Bognor.

„ 345. Blanford, Dr. W. T., on the supposed locality „Sulgrane," whence indian Jurassic Ammonites were said to have been obtained. Der Name lautet Saligram und bezeichnet keine Lokalität, sondern kleine Ammoniten und andere Versteinerungen, welche von den Indern mit dem Wischnu-Kult in Verbindung gebracht werden.

„ 346. Bridgman, F. G., on the want knowledge of the animals of the Genus Oliva as a means to the determination of the species.

„ 348. Sykes, E. R., Notes on some British Eulimidae. With pl. 14 Neu Eu. collinsi p. 349 t. 14 fig. 8 von Guernsey. Abgebildet sind Eu. anceps Marshall t. 14 fig. 11; — Eu. compactilis Mtrs. t. 14 fig. 13; — Eu. curva Mtrs t. 14 fig. 1. 6; — Eu. frlilei Jordan t. 14 flg. 5. 9; — Eu. incurva Ren. t. 14 fig. 3. 4; — Eu. Martyn — Jordani Jordan t. 14 fig. 7; — Eu. pernula Mtrs. t. 14 fig. 2. 10. 12. — Eu. solida Jeffr. nec Sow. erhält den neuen Namen Eu. platyacme.

„ 354. Smith, Edgar A., a list of the species of Mollusca from South Africa, forming an appendix to G. B. Sowerby's „Marine Shells of South Africa" — 390 Arten, davon neu: Siphonaria nigerrima p. 356, t. 15 fig. 4. 5; — S. tennicostulata p. 356, t. 15 fig. 14. 15; — Oxynoë natalensis p. 359, t. 15 fig 8; — Terebra loisae p. 360, t. 15 fig. 1; — T. casta var. natalensis — Marginella fallax p. 365, t. 15 fig. 20; — Nassa natalensis (-sturmii Reeve nec Phil.) p. 373. t. 15 fig. 6; — Latiaxis rosaceus (-nodosa Sow. nec Adams) p. 376, t. 15 fig. 16; — Purpura pura p. 376, t. 15 fig. 21; — Sistrum squamiliratum p. 377, t. 15 fig. 17 — Bittium quadricinctum p. 381, t. 15 fig. 11; — Natica burnupi p. 385. t. 15 fig. 11; — Turbonilla similaris p. 386, t. 15 fig. 13; — Clanculus mixtus p. 389, t. 15, fig. 7; — Dentalium regulare p. 393, t. 15 fig. 2; — Kellia natalensis p. 396, t. 15 fig. 8; — Corbula rugifera p. 399, t. 15 fig. 9. 10.

p. 403. Newton, R. Bullen, Notes on some Jurassic shells from Borneo, including a new species of Trigonia (molengrafi t. 16. fig. 1—6).

„ 410. Melvill; J. C. & E. R. Sykes, Description of Marginella lateritia n. sp. from the Andaman Islands (woodcut).

Journal de Conchyliologie vol. 51 no. 2.

p. 97. Ancey, C. F., Faune macacologique terrestre de l'ite de Cocos dans l'Ocean Pacifique. Sechs Arten, keine neu. Der Autor erklärt Guppya hopkinsi Dall für identisch mit Microcystis pacifica Pfr. und vermutet, dass Tornatellina pittieriana Martens mit der angeblich aus Nicaragua stammenden T. cumingiana Pfr. zusammenfalle und die Cuming'sche Fundortsangabe falsch sei.

„ 105. Cossmann, M.. Faune pliocénique de Karikal (Inde francaise). Mit Taf. 3—5. Neu: Sveltia morgani, Trigonostoma tonnettii, Ancilla tornata, Marginella karikalensis, Cryptospira cuneata, Euthriofusus inopinatus, Streptosiphon macrospira, Melongena proteiformis, M. octocostata, Siphonalia heptozodes, Cyllene varians, Latrunculus occlusus, Nassa ovum, N. karikalensis, N. colpophora, Amycla dimorpha, Phos macrostoma, Anachis crassicostata, Murex bonnetti, Muricidea infratabulata, Muricopsis diarti, Typhis tetrogoniatus, Ranella karikalensis, Persona metableta, Cassis bonnetti, Strombus karikalensis, Rimella margaritae, Mangilia hondasi, Clathurella bicrenata, Asthenotoma terebralis, Raphitoma crenicostata.

The Nautilus, vol. XVII 1903/1904.

p. 1. Elrod, Morton J., Montana Shells.

„ 6. Raymond, Wm. J., Writings of James G. Cooper on Conchology and Palaeontology.

„ 13. Walker, Bryant, Notes on Eastern American Ancyli. With plate. Zwei neue Sektionen Laevapex und Ferrisia.

„ 19. Aldrich, T. H., two new species of Eocene Fossils from the Lignitic of Alabama (Umbraculum elevatum und Gastrochaena striatula).

„ 23. Billups, A. C., a proposed study of Goniobasis.

„ 25. Walker, Bryant, Notes on Eastern Ancyli (Cont, With pl. 2.)

„ 31, Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, Description of neu Japanese Land Shells. (Japonia sadoensis p. 31; — Chloritis toramis p. 31; — Kaliella xenica p. 32.)

„ 32. Hinkley, A. A., a proposed study of Goniobasis.

p. 34. Baldwin, D. D., Descriptions of new species of Achatinellidae from the Hawaian Jsles. — Neu: Amastra henshawi, Am. saxicola p. 34; — Am. senilis, Am. fossilis p. 35.

„ 37. Dall, W. H., two new mollusks from the West Coast of America (Sigaretus noyesi, Tonicia arnheimi).

„ 38. Baker, Frank C., Pleistocene Mollusks of White Pond, New Jersey.

„ 39. Williamson, Mrs. M. Burton, on cataloguing a collection of shells.

„ 42. Sterki. V., new North American Pisidia. — Neu: S. ashmuni p. 42, Neu Mexiko; — P. danielsi p. 42, Indiana;

„ 44. Pilsbry, H. A., Y. Hirase, Notices of new Japanese Land Shells. Neu: Euhadra euterpe, Plectotropis marginata p. 44; — Aegista friedeliana var. peraperta, Plectotropis conomphala, Hirasea planulata p. 45; — Kaliella incensa, K. harimensis var. sadoënsis p. 46.

„ 49. Frierson, L. S., the specific value of Unio declivis Say. With pl, 3.

„ 51. Dall, W. H., a new species of Metzgeria (californica).

„ 52. Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, Notices of new Land shells of the Japanese Empire. Neu: Euhadra quaesita var. decorata p. 52; Eu. connivens var. diversa, Eu. submandarina var. migakejimana und var. niijimana; Ennea iwakawa var. oshimana, Tonatellina kitoiwojimana p. 53. — Kaliella peralta var. izuschichitoensis, K. nesiotica, Sitala nizimana p. 54.

„ 55. Dall, W. H., Note on the Family Septidae. — Dall vertritt gegenüber Kesteven die Annahme des Namens Septa Perry für den alteingebürgerten, aber präoccupierten Namen Triton Montf.

„ 56. Ancey, C. F., on some new Land Mollusca from Middle America (Streptostyla sumichrasti, Str. clavulata).

„ 57. Baker, Frank Collins, a partial list of the Marine Mollusks of San Salvador, Bahamas.

„ 61. Dall, W. H., a new genus of Trochidae (Stylobates, für St. aeneus neu, aus dem Tiefwasser von Hawaii).

„ 62. Jarvis, P. W., Distribution of Jamaican Species of Colobostylus·

„ 65. Pilsbry, H. A.. a new Jamaican Colobostylus (nuttii).

„ 66. Lowe, Herbert N., Notes on the Mollusk Fauna of San Nicholas Island.

„ 69. Pilsbry, H. A., new Japanese Marine Mollusks. — Phasianella tristis, Gibbula affinis var. cognata, G. vittata p. 69; — G incarnata, Monilea nucleolus p. 70; — Clanculus gemmulifer var. pallidus p. 71.

p. 73. Johnson, Charles W., notes on the genus Fulgur.

„ 75. Pilsbry, H. A., the greatest american Planorbis (magnificus n).

„ 76. Frierson, L. S., Observations on the Byssus of Unionidae.

„ 77. Pilsbry, H. A., a new Guppya from Florida (miamiensis).

„ 78. Pilsbry, H. A. & Y. Hirase, new land snails of the Japanese Empire. (Eulota luhuana yakushimana, Ganesella moellendorffiana, Pristiloma japonica).

„ 79. Sterki, V., new Pisidia. — P. complanatum p. 79; — rowelli n. p. 80; — cuneiforme n. p. 81.

„ 80. Ancey, C. F., new Land Shells from South America. (Epiphragmophora orophila, Porphyrobaphe sarcostoma).

Sitzungs-Berichte der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin, Jahrg. 1903 no. 8 und 9.

p. 393. Martens, Ed. von, durchbohrte Schalen von Landschnecken. Wir kommen auf diesen Artikel demnächst zurück.

„ 397. — —, über das Vorkommen von Campylaea preslii und Pupa edentula bei Reichenhall.

„ 417. — — Land- und Süsswasser Conchylien von Ost-Borneo. Gibt eine interessante Uebersicht über die Kenntnis der Binnen-Mollusken Borneos und deren Entwicklung und beschreibt als neu (nach den Sammlungen eines Sohnes des Archidiakonus Adolf Schmidt): Cychlotus peramplus p. 421; — C. (Platyrhaphe) bicolor p. 421; — Hemìplecta densa var. annectens p. 422; — Chloritis brachystoma p. 422; — Planispira? semiquadrivolis p. 423; — Amphidromus martensi capistratus, p. 424, mit Textfigur; — Amph. adamsi var. obliquatus p. 424 mit Textfigur; — Clausilia filialis p. 425; — Unio (Quadrula) Nieuewenhousi var. parcesculptus p. 425; — Batissa Schmidti p. 426, mit Textfigur.

The Journal of Conchology. Vol. 11 no. 1.

p. 9. Jackson, John W. & Fred Taylor Observations on the Habits and Reproduction of Paludestrina (woodcut).

„ 11. Tomlin, J. R. le Brockton, Paludestrina anatina Drp. new to Britain.

„ 11. Baldwin, J. W., Jaminia muscorum mut. sinistrorsum.

„ 12. Kenyon, Agnes F., Note on Cassis paucirugis Mke.

„ 13. Jakson, John W., Report on the Miller's Dale Ramble.

„ 14. Hoyle, W. E., Jsaac Cooke Thompson. Necrolog.

p. 15. Dean, J. D. Fish and their relation to Paludestrina jenkinsi: Nur der Karpfen frisst das kleine Schneckchen gern, alle anderen Fischarten nur, wenn sie gar nichts anderes finden.

„ 16. Welch, R., rare or local Irish Land and Freshwater Mollusca.

„ 19. Whitwell, William, Physa acuta Drp. at Kew Garden.

„ 27. Hoyle, W. E.. Sepia burnupi n. sp. from Natal. With plate 1.

„ 29. Welch, R., some Results of a Flood in North-Ireland.

Sowerby, G. B. Mollusca of South Afrika. — From: Marine Investigations South Afrika. Vol. II Cape of Good Hope.

Als neu werden beschrieben: Surcula lobata p. 213 t 4 fig. 9; — Drillia fossata p. 214 t. 3 fig. 5; — Dr. scitecostata p. 214 t. 4 fig. 10; — Clavatula turriplana p. 215 t. 3 fig. 6; — Clavus lignarius p. 215 t. 3 fig. 4; — Genota belaeformis p. 216 t. 4 fig. 8; — Eucythara africana p. 216 t. 5 fig. 9; — Conus eucoronatus p. 217 t. 3 fig. 9; — C. gilchristi p. 217 t. 3 fig. 8; — C. patens p. 218 t. 3 fig. 7; — Cypraea fultoni p. 218 t. 4 fig. 7; — Nassa desmoulioides p. 219 t. 4 fig. 1; — N. analogica p. 219 t. 4 fig. 3: — Cancellaria producta p. 220 t. 4 fig. 5; — Epidromus crebriliratus p. 220 t. 4 fig. 4; — Scala tenebrosa p. 220 t. 4 fig. 6; — Astralium gilchristi p. p. 221 t. 5 fig. 6; — Calliostoma perfragile p. 222 t. 5 fig. 3; — C. granoliratum p. 222 t. 5 fig. 7; C. iridescens p. 223 t. 5 fig. 4; — Solariella persculpta p. 223 t. 5 fig. 8; — Minolia congener p. 223 t. 5 fig. 2; — Dentalium inflexum p. 224 t. 5 fig. 11; — D. africanum p. 224 t. 5 fig. 12; — Chiton sykesi p. 225 t. 5 fig. 13. — Angefügt sind eine Reihe Bemerkungen über wenig bekannte südafrikanische Arten.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia, vol. IV. 1903 Part. 1.

p. 193. Pilsbry, H. A., Molluska of Western Arkansas and adjacent States, with a revision of Paravitrea. Das zerrissene, über die umgebenden Ebenen emporragende Gebiet zeigt eine ganz eigentümliche Variabilität seiner Schneckenfauna, weit verbreitete, sonst konstant bleibende Arten werden hier variabel, aber die Variation geht in einigen bestimmten Hauptrichtungen und erreicht an verschiedenen Punkten sehr verschiedene Grade. Als neu aufgestellt werden: Polygyra albolabris fuscolabris p. 200; — Pol. blandiana p. 203 t. 9 fig. 11—13; — Vitrea capsella lacteodens p. 211 t. 11 fig. 5.

p. 315. Pilsbry, H. A., Additions to the Japanese Land Snail Fauna No. VIII. — Neu: Hemiphaedusa sadoënsis p. 305 t. 14 fig. 6—10; — H. shikokuënsis var. inskuchiensis p. 316; — H. sus p. 316 t. 14 fig. 1—5; — H. aratorum p. 316 t. 14 fig. 15—18; H. aenea p. 317 t. 14 fig. 11—14; — H. platyderula p. 317 H. bilabrata var. tosaensis p. 318; — Stereophaedusa echigoënsis p. 318; — St. japonica var. perstriata p. 319.

The Journal of Malacology vol. X No. 2.

p. 27. Melvill I. C., a Revision of the Columbellidae of the Persian Gulf and North Arabian Sea, with description of C. Calliope n. sp. (Textfigur).

„ 31. Bloomer, H. H. the anatomy of certain species of Ceratisolen and Solecurtus (with pl. 2).

„ 43. Bloomer, H. H., on the origin and function of the fourth aperture in some Pelecypoda.

„ 45. Gude, G. K., a classified list of the Helicoid Land Shells of Asia. Part. VI. With pl. 3. — Als neu beschrieben und abgebildet werden: Dyakia smithiana p. 47 t. 3 fig. 1, Sumatra; — Planispira quadrifasciata var. halmaherica n. p. 48 t. 3 fig. 2; Trichochloritis tabularis p. 48 t. 3 fig. 5, Sumatra; — Calocochleas talautana p. 49 t. 3 fig. 3.

„ 62. Suter, Henry, on a new genus and species of the family Phenacohelicidae (Ranfurla constanciae t. 4 fig. 1—5, Auckland Islands.)

„ 64. Sykes, E. R., Descriptions of new Land Shells from the Austro-Malayan Region. — Neu: Xesta sulcatula, Buru, p. 64; — Cristigibba albopicta p. 64, Halmahera: — Papuina callosa p. 65, Halmahera; — P. wallaceana p. 65 Waigiu; — Leptopoma diplochilus p. 66, Waigiu; — Leucoptychia lamellatum p. 66, Waigiu; — Palaina ponsonbyi p. 66, Waigiu; — Omphalotropis waigiouensis p. 67, Waigiu; — Helicina varians p. 67. Santa Cruz Archipel. (Die Abbildungen in No. 3 Taf. 6.)

— —, vol. X no. 3.

p. 73. Sowerby, G. B.. Descriptions of new species of Nassa, Purpura, Latirus, Voluta, Conus, Stomatella und Spondylus. With pl. 5. — Neu: Nassa optima p. 73 t. 5 fig. 12, Nordwest-Australien; — Purpura eudeli p. 74 t. 5 fig. 3, Gorée; — Voluta dohrni p. 74 t. 5 fig. 8, Florida; — Lyria planicostata p. 75 t. 5 fig. 7, unbekannten Fundortes; — Conus boubeae p. 76 t. 5 fig. 5. desgleichen; — Stomatella exquisita p. 76 t. 5 fig. 4 desgleichen;

Spondylus occidens p. 77 t. 5 fig. 9, Philippinen; — Sp. reesianus p. 77 t. 5 fig. 6, Molukken.

p. 78. Sykes, R. E., notes on with illustrations of Austromalayan Land-Shells. (Die Abbildungen zu den S. 64 ff. beschriebenen Arten). With pl. 6.

„ 79. Collinge, Walter E., Contributions to a knowledge of the Mollusca of Borneo. I. With pl. 7 und 8. Neu: Damayantia simrothi p. 79 fig. 1—2; — D. rugosa p. 80 fig. 3—4; — Collingea eranna p. 80 t. 7 fig. 5.6, t. 8 fig. 13.14; — Parmarion shelfordi p. 81 t. 7 fig. 78, t. 8 fig. 15.16; — Atopos shelfordi p. 82 t. 7 fig. 9—12.

„ 83. Gude, G. K., a classified list of the Helicoid Land Shells of Asia VII.

„ 99. Fulton, Hugh, Figures and varieties of Ennea etc. — With pl. 9 (Neu; Ennea oleacea p. 99 t. 9 fig. 9. Deutsch-Ostafrika; — Macrochlamys bathycharax G. A. p. 99 t. 9 fig. 6 Port Blair; — Cochlostyla delicata p. 100 t. 9 fig. 10, unsicheren Fundortes; — Borus separabilis p. 100 t. 9 fig. 12, Peru?; — Odontostomus toleratus p. 100 t. 9 fig. 2, Brasilien; — Leptopoma placidum p. 101 t. 9 fig. 7, Südflores; — L. albicans p. 101 t. 9 fig. 5. Sumba; — Cataulus connectens p. 102 t. 9 fig. 4, Ceylon; — C. greeni var. robusta p. 102 t. 9 fig. 1, Ceylon; — Coptocheilus perakensis p. 102 t. 9 fig. 3 Perak; — Topidophora perfecta p. 102 t. 9 fig. 11, Madagaskar; — T. plurilirata p. 103 t. 9 fig. 8, Capland.

Eingegangene Zahlungen:

P. Ehrmann, Leipzig, Mk. 12.—; Naturforschende Gesesellschaft. Görlitz, Mk. 6.—; Aug. Gysser, Strassburg, Mk. 6.—; Ludw. Henrich, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; Paul Hesse, Venedig, Mk. 12.—; R. Jetschin, Patschkau, Mk. 6.—; Professor Dr. K. Miller, Stuttgart, Mk. 6.—; Naturwissenschaftliches Museum, Hermannstadt, Mk. 12.—; W. Pässler, Berlin, Mk. 6.—; G. S. Parry, Eastbourne, Mk. 6.—; J. Ponsonby, London, Mk. 6.—; A. Protz, Mittelhufen, Mk. 6.—; V. S. Ritter v. Lasser, Salzburg, Mk. 6.—; — M. M. Schepman, Rhoon, Mk. 6.—; C. Schwefel, Cüstrin, Mk. 6.—; Sowerby & Fulton, London, Mk. 12.—; C. M. Steenberg, Kopenhagen, Mk. 6.—; A. Wertheim, Berlin, Mk. 6.—; Dr. Karl Brancsik, Trencsin, Mk. 18.—; Fr. Borcherding, Vegesack, Mk. 6.—; H. Roos, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; Prof. Dr. F. Kinkelin, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; Prof. Dr. Ed. v. Martens, Berlin, Mk. 6.—.